

Tulburare din Spectrul Autist

Psiho-educație

- oferire de informații despre diagnoză, simptome și posibile intervenții
- conversație despre așteptările de viitor
- informare despre instituții, organizații, specialiștii etc. care pot oferi sprijin

Intervenție comportamentală

- stimularea dezvoltării: abordare educativă (TEACCH) bazată pe oferirea unui climat de educare structurată și direcționată pe creștere și dezvoltare
- suport și consiliere pentru școală, timpul liber, locuință și muncă
- terapie comportamentală pentru diminuarea problemelor care apar și care intervin în dezvoltarea optimă
- consiliere parentală/familială (a sistemului din care face parte)

Intervenție medicamentoasă

Identificarea simptomului de bază care conduce cel mai mult la disfuncționare

Comportament disruptiv

1. Rispolept, rispen
2. Aripiprazol (abilify) Pipamperon

Simptome de ADHD

1. Concerta xl
2. Dexamfetamine
3. Strattera
4. Clonidin
5. Rispolept, Rispem sau Pipamperon

Frica și depresia (fără agresivitate)

1. Anxetin, Fluvoxamine sau Cipramil
2. Rispolept, Rispem sau Pipamperon

Comportament repetitiv/obsedat

1. Anxetin, Fluvoxamine
2. Rispolept, Rispem
3. Pipamperon

Nivelul de dovadă a funcționării medicației

Nivel 1. Bazat pe evaluare sistematică și pe cel puțin două cercetări independente de randomizare comparative

Nivel 2. Bazat pe cel puțin două cercetări independente de randomizare comparative cu calitate medie/cantitate insuficientă